

Name	Pflanz- jahr ca.	Höhe in m ca.	BHD in cm ca.	Bemerkungen	bl.	fr.
<i>Abelia mosanensis</i>	2001	1,75			x	
<i>Abeliophyllum distichum</i>	1999	1,20			x	x
<i>Abies firma</i>	1999	1,75		aus Seitentrieb		
<i>Acer x zoeschense</i>	1984	6,50			x	x
<i>Actinidia kolomikta</i>	1995	8,00		männlich, sehr bunt	x	
<i>Alangium platanifolium</i>	1984	3,75		gesund und wüchsig	x	x
<i>Aristotelia chilensis</i>	1997	2,50		winterhart bis -12 °C	x	x
<i>Aronia arbutifolia atropurpurea</i>	1975	2,50		Herbstfärbung	x	x
<i>Aronia arbutifolia 'Brilliant'</i>	1999	2,50		Früchte und Herbstfärbung	x	x
<i>Aronia melanocarpa elata</i>	1996	2,50		straff aufrecht	x	x
<i>Aronia melanocarpa grandiflora</i>	1975	4,50		sehr groß	x	x
<i>Asimina triloba</i>	1984	4,50	8,5	Früchte ausreifend	x	x
<i>Berberis buxifolia</i>	1984	1,50			x	
<i>Carpinus viminea</i>	2001	3,50		sehr elegant, rötlicher Austrieb	x	x
<i>Cercis griffithii</i>	1964	4,00		echt, ähnlich C. siliquastrum	x	x
<i>Cercis racemosa</i>	1964	7,25		sehr gesund, reichblühend	x	x
<i>Cercis sinensis</i>	1999	1,50		krank, Triebsterben		
<i>Chamaecyparis thyoides 'Glauca'</i>	1994	1,20		aus Tharandt		
x <i>Chitalpa taschkentensis</i>	1998	5,50		winterhart bis -12 °C	x	
<i>Chusquea culeou L. N.</i>	2001	3,00		eigene Aussaat		
<i>Corynabutilon bicolor L. N.</i>	2004	0,40		? hart, langsamer Wuchs		
x <i>Crataemespilus grandiflora</i>	2004	0,60		wurzelecht		
<i>Crinodendron patagua</i>	1984	1,75		sehr geschützter Standort	x	x
<i>Daphne pontica</i>	1972	0,50			x	x
<i>Daphniphyllum macropodum</i>	1970	3,50		einhäusig ! gesund	x	x
<i>Diospyros kaki</i>	1993	2,50		sehr schöne Herbstfärbung	x	x
<i>Dipelta floribunda</i>	1998	2,00		hart, sehr schön	x	x
<i>Dipteronia sinensis</i>	1993	2,00		wüchsig, hart		
<i>Disanthus cercidifolius</i>	1993	1,25		erstmal fruchtend	x	x
<i>Distylium racemosum</i>	1984	3,50		schlank aufrecht, blühend	x	
<i>Edgeworthia papyrifera</i>	2003	0,80		? Erfolg bleibt abzuwarten	x	
<i>Ehretia dicksonii</i>	1968	5,00	2 x 6	sehr dekorative, weiße Blüte	x	
<i>Emmenopterys henryana</i>	1993	3,50	5,5	gute Belaubung, kaum blühend		
<i>Eucryphia glutinosa</i>	1984	3,50		hart, gesunde Prachtpflanze	x	x
<i>Euscaphis japonica</i>	2001	3,00		spärlich fruchtend	x	x
<i>Fagus grandifolia</i>	1993	7,00	10,5			
<i>Franklinia alatamaha</i>	1993	2,50		schön, nicht sehr wüchsig	x	
<i>Garrya elliptica</i> ♂	1984	3,75		hart bis -12 °C	x	
<i>Ginkgo biloba 'Berthold Leendertz' (Säule)</i>	1972	4,50	5,5	form. nov., schmale Säule, langsam wachsend		

bl.	blühend	form. nov.	forma nova (neue Sorte)
fr.	fruchtend	L. N.	locus natalis (Naturstandort)

Name	Pflanz- jahr ca.	Höhe in m ca.	BHD in cm ca.	Bemerkungen	bl.	fr.
<i>Halesia diptera</i> var. <i>magniflora</i>	2002	1,75			x	
<i>Hydrangea serrata prolifera</i>	1994	1,00		Sternhortensie, ungewöhnlich	x	
<i>Hydrangea villosa</i>	1995	1,25		spätfrostempfindlich	x	
<i>Ilex ciliospinosa</i>	1997	2,25			x	x
<i>Ilex cornuta</i> × <i>pernyi</i>	1997	3,50			x	x
<i>Ilex fargesii</i>	2000	2,50			x	x
<i>Ilex</i> × <i>koehneana</i> 'Chestnut Leaf'	1967	5,00			x	x
<i>Illicium anisatum</i>	2004	0,40		guter Duft	x	
<i>Illicium henryanum</i>	2004	0,40		guter Duft	x	
<i>Itea virginica</i>	1967	0,75		hervorragend im Schatten	x	
<i>Kalmia carolina</i>	1983	0,50			x	
<i>Koelreuteria integrifolia</i>	1983	6,50	11,5	sehr spät blühend	x	
<i>Lagerstroemia indica</i>	1967	5,50		hart bis -12°C	x	
<i>Ledum glandulosum</i>	1967	0,50			x	
<i>Lindera benzoin</i>	1967	4,00			x	x
<i>Lindera obtusiloba</i>	2002	3,50				
<i>Lindera praecox</i>	1963	3,00			x	
<i>Liquidambar formosana</i> <i>monticola</i>	1967	8,50	14	gute Herbstfärbung	x	x
<i>Maddenia hypoleuca</i>	1994	2,00			x	
<i>Magnolia denudata</i>	1967	8,00		ein weißer Traum	x	
<i>Magnolia macrophylla</i>	1980	2,75			x	
<i>Magnolia obovata</i>	2000	2,50				
<i>Magnolia officinalis biloba</i>	1967	6,50	8		x	
<i>Magnolia sieboldii</i>	1967	4,00			x	x
<i>Magnolia sprengeri</i>	1967	8,50	21,5	prachtvoller Baum	x	x
<i>Magnolia tripetala</i>	1967	8,50	15,5		x	x
× <i>Mahoberberis miethkeana</i>	1967	3,50		kein Mehltau!	x	
<i>Mahonia gracilipes</i>	1999	0,50		Blüten im Sommer, violett	x	x
<i>Mahonia veitchiorum</i> ssp. <i>kingdon-wardiana</i>	1999	0,75		Blüten im Sommer, orange	x	x
<i>Meliosma cuneifolia</i>	1997	1,30		sehr gesundes Laub	x	
<i>Meliosma pendens</i>	1971	3,00			x	x
<i>Menziesia ciliicalyx rubra</i>	1996	0,50			x	x
<i>Mespilus germanica</i> L. N.	1997	1,50		Wildform	x	x
<i>Myrica pensylvanica</i>	1972	1,25			x	x
<i>Nandina domestica</i>	2002	1,00			x	x
<i>Neviusia alabamensis</i>	1983	2,00			x	x
<i>Nothofagus pumilio</i> L. N.	2001	0,75		sehr schwierig		
<i>Nyssa sinensis</i>	1987	4,50		prachtvolle Herbstfärbung		
<i>Nyssa sylvatica</i>	1965	6,50	12,5+10		x	
<i>Osmanthus</i> × <i>burkwoodii</i>	1982	3,50			x	

bl.	blühend	form. nov.	forma nova (neue Sorte)
fr.	fruchtend	L. N.	locus natalis (Naturstandort)

Name	Pflanz- jahr ca.	Höhe in m ca.	BHD in cm ca.	Bemerkungen	bl.	fr.
<i>Osmanthus decorus</i>	1965	3,00			x	
<i>Petteria ramentacea</i>	1982	3,00			x	x
<i>Photinia beauverdiana</i>	1978	4,50			x	x
<i>Photinia villosa</i>	1965	5,50			x	x
<i>Phyllanthus glaucus</i>	1992	3,00		Herbstfärbung	x	
<i>Picrasma quassioides</i>	1978	6,00	16	Herbstfärbung	x	x
<i>Pinus attenuata</i>	1978	6,50	23		x	x
<i>Pinus bungeana</i>	1975	5,00		abgängig nach Schneebruch		
<i>Pinus coulteri</i>	1978	8,50	23		x	x
<i>Pinus × holfordiana</i>	1965	11,00	68		x	x
<i>Pinus monophylla</i>	1982	2,00				
<i>Piptanthus laburnoides L. N.</i>	1978	2,00		Tibet	x	x
<i>Platycrater arguta</i>	2001	0,60			x	x
<i>Podocarpus alpina</i>	1978	0,60		einhäusig!	x	x
<i>Podocarpus (Prumnopitys) andina</i>	1992	4,00		sehr gesund		
<i>Podocarpus nivalis</i>	1978	0,60			x	
<i>Prinsepia sinensis</i>	1992	2,50			x	
<i>Prunus mume</i>	1992	4,50			x	
<i>Prunus padus 'Colorata'</i>	1972	7,50			x	
<i>Prunus spinosa (rotblättrig)</i>	1972	6,00			x	
<i>Pseudotaxus chienii</i>	2001	1,30		weiblich	x	
<i>Quercus alba</i>	1972	7,00	16			
<i>Quercus aliena</i>	1978	6,50	14			
<i>Quercus dentata</i>	1965	5,50	19			
<i>Quercus ilicifolia</i>	1978	2,00				
<i>Quercus laurifolia</i>	1972	10,00	21			
<i>Quercus × hickelii (robur × pontica)</i>	1965	12,00		vielstämmig	x	x
<i>Quercus mongolica var. grosseserrata</i>	1972	8,00	13			
<i>Quercus nigra</i>	1993	12,00	21			
<i>Quercus pedunculiflora</i>	1965	12,00	23			
<i>Quercus pontica</i>	1965	8,00		vielstämmig	x	x
<i>Rhus aromatica</i>	1978	2,25			x	
<i>Ribes laurifolium</i>	2002	0,40			x	
<i>Ribes speciosum</i>	1972	2,50			x	
<i>Rosa roxburghii normalis</i>	1972	1,75			x	x
<i>Rosa damascena 'Trigintipetala'</i>	1992	1,50		Ölrose, Duft	x	x
<i>Sapium japonicum</i>	2006			Aussaat 2005, Herbstfärbung		
<i>Sassafras albidum</i>	1965	8,50	32		x	
<i>Sassafras tzumu</i>	1997	7,00	8	sehr schlank	x	
<i>Sequoia sempervirens</i>	1968	12,00	34	27 Bäume (Dr. Martin)	x	x

bl.	blühend	form. nov.	forma nova (neue Sorte)
fr.	fruchtend	L. N.	locus natalis (Naturstandort)

Name	Pflanz- jahr ca.	Höhe in m ca.	BHD in cm ca.	Bemerkungen	bl.	fr.
<i>Sequoiadendron giganteum</i>	1964	13,00	68		x	x
<i>Sinocalycanthus chinensis</i>	1992	2,50		sehr gesund, lange blühend	x	x
<i>Sinojackia xylocarpa</i>	1972 1992	3,00 3,00		2 Herkünfte, deutlich unterschiedlich	x	x
<i>Sophora viciifolia</i> L. N.	1984	3,50			x	x
<i>Sorbaria arborea</i>	1964	4,00			x	
× <i>Sorbopyrus auricularis</i>	1964	7,00	18		x	
<i>Stachyurus sinensis</i>	1964	3,50			x	x
<i>Staphylea</i> × <i>elegans</i> 'Hessei'	1964	4,00		Nachzucht (Sämling vorhanden)	x	x
<i>Staphylea trifolia</i>	1992	2,00			x	
<i>Stauntonia hexaphylla</i>	1984	3,00			x	x
<i>Stewartia koreana</i>	2002	1,25				
<i>Stewartia monadelpha</i>	1964	5,00			x	x
<i>Stewartia pseudocamellia</i>	1964	2,00			x	x
<i>Stewartia serrata</i>	1972	3,50		sehr früh blühend	x	x
<i>Styrax hemsleyana</i>	2002	0,75				
<i>Styrax japonica</i>	1975	7,00	11		x	x
<i>Styrax japonica</i> 'Anna Paulowna'	2000	3,50		form. nov., leicht hängend, rosa	x	x
<i>Styrax japonica</i> 'Pink Chimes'	1998	3,00			x	x
<i>Styrax obassia</i>	1984	3,50			x	x
× <i>Sycoparrotia semidecidua</i> F2	2001	2,50		form. nov., Herbstfärbung		
<i>Sycopsis sinensis</i>	1988	4,50		breit wie hoch, gesund	x	
<i>Symplocos paniculata</i>	1994	3,50			x	x
<i>Syringa japonica</i>	1992	0,75			x	x
<i>Syringa pekinensis</i>	1978	5,00			x	x
<i>Taiwania cryptomerioides</i>	1967	6,50	18	gesund		
<i>Taxus chinensis meyeri</i> L. N.	1992	3,50				
<i>Tetracentron sinense</i>	1996	3,50		braucht Halbschatten		
<i>Tilia henryana</i>	1988	5,00			x	x
<i>Trachycarpus excelsa</i>	1964	2,50		sehr üppige Pflanze		
<i>Tripetaleia racemosa</i>	1996	0,50			x	x
<i>Trochodendron aralioides</i>	1984	3,50			x	x
<i>Umbellularia californica</i>	1984	6,00	22	hart	x	
<i>Weigela middendorffiana</i>	2001	1,75			x	
<i>Xanthoceras sorbifolium</i>	1984	3,00			x	x
<i>Yucca recurvifolia</i>	1964	2,00		stammbildend, hier in Bauerngärten verbreitet	x	

bl.	blühend	form. nov.	forma nova (neue Sorte)
fr.	fruchtend	L. N.	locus natalis (Naturstandort)